



Math93.com

# Devoir Surveillé n°4

## Correction

### Première ES

#### Bilan

Durée 2 heures - Coeff. 8

Noté sur 20 points

### Exercice 1. QCM

5 points

#### QCM A

1. Question 1 : 1.a. : 40 euros
2. Question 2 : 2.b. :  $]-\infty ; -1[ \cup ]3 ; +\infty[$
3. Question 3 : 3.a. :  $f'(x) = \frac{x^3 + 2}{x^2}$
4. Question 4 : 4.a. :  $y = \frac{3}{2}x + 2$
5. Question 5 : 5.b. : 91,9005

#### QCM B

1. Question 1 : 1.a. :  $]-1 ; 3[$
2. Question 2 : 2.a. :  $f'(x) = \frac{x^3 + 2}{x^2}$
3. Question 3 : 3.a. :  $y = \frac{3}{2}x + 2$
4. Question 4 : 4.b. : 91,9005
5. Question 5 : 5.a. : 40 euros

### Exercice 2. D'après Bac ES 2014 - Antilles-Guyane

7 points

Pour tout entier naturel  $n$ , le terme  $u_n$  donne une estimation du nombre d'abonnés pour l'année 2013 +  $n$  :

$$\begin{cases} u_0 = 20 \\ u_{n+1} = 0,92u_n + 3. \end{cases}$$

#### Partie A

5 points

1. En utilisant cette modélisation, l'opérateur décide d'arrondir les résultats à  $10^{-3}$ , c'est à dire au milliers d'abonnés.

1. a. [0.5 point] Déterminer les trois premiers termes,  $u_0$ ,  $u_1$  et  $u_2$  et le nombre d'abonnés en 2014 et 2015.

$$\begin{cases} u_0 = 20 \\ u_1 = 0,92u_0 + 3 = 21,4 \\ u_2 = 0,92u_1 + 3 = 22,688 \end{cases}$$

Donc le nombre d'abonnés en 2014 est de 21,4 millions et en 2015 de 22,688 millions.

1. b. [1 point] La suite  $(u_n)$  est-elle arithmétique ? géométrique ?

#### Arithmétique ?

- $u_1 - u_0 = 1,4$ ;
- $u_2 - u_1 = 1,288 \neq u_1 - u_0$ .

Les variations absolues sont différentes donc la suite  $u$  n'est pas arithmétique.

#### Géométrique ?

- $\frac{u_1}{u_0} = 1,07$ ;
- $\frac{u_2}{u_1} \approx 1,060187 \neq \frac{u_1}{u_0}$ .

Les rapports sont différents donc la suite  $u$  n'est pas géométrique.

2. On définit la suite  $(v_n)$  par  $v_n = u_n - 37,5$  pour tout entier naturel  $n$ .

[2 points] Démontrer que  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison 0,92. Préciser son premier terme.

Pour tout entier  $n$  on a :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 37,5 \\ &= 0,92u_n + 3 - 37,5 \\ &= 0,92u_n - 34,5 \\ &= 0,92 \left( u_n - \frac{34,5}{0,92} \right) \\ &= 0,92 (u_n - 37,5) \\ v_{n+1} &= 0,92v_n \end{aligned}$$

La suite  $(v_n)$  est donc une suite **géométrique de raison  $q = 0,92$ , et de premier terme  $v_0 = u_0 - 37,5 = -17,5$ .**

$$(v_n) : \begin{cases} v_0 &= -17,5 \\ v_{n+1} &= 0,92v_n \end{cases} ; \forall n \in \mathbb{N}$$

3. [1 point] Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ . En déduire que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_n = -17,5 \times 0,92^n + 37,5$ .  
On peut donc écrire que :

$$\forall n \in \mathbb{N} ; v_n = -17,5 (0,92)^n$$

De l'égalité  $v_n = u_n - 37,5$  définie pour tout entier  $n$ , on peut en déduire l'expression de  $u_n = v_n + 37,5$  soit :

$$\forall n \in \mathbb{N} ; u_n = -17,5 \times 0,92^n + 37,5$$

4. [0.5 point] Déterminer le nombre d'abonnés en millions en 2020. Arrondir les résultats à  $10^{-3}$ .

En 2020 cela correspond à  $n = 7$  donc  $u_7 \approx 27,738$ .

L'opérateur aura donc en 2020 environ **27,738 millions d'abonnés**.

## Partie B

2 point

1. [1 point] Compléter l'algorithme suivant afin de déterminer le nombre d'années nécessaires à partir de 2013 pour que l'opérateur fasse des bénéfices. **Ne recopier sur votre copie que les deux instructions manquantes.**

<b>Variables :</b>	$N$ un nombre entier naturel non nul $U$ un nombre réel
<b>Traitement :</b>	Affecter à $U$ la valeur 20 Affecter à $N$ la valeur 0 Tant que $U \leq 25$ affecter à $U$ la valeur $0,92 \times U + 3$ affecter à $N$ la valeur $N + 1$ Fin Tant que
<b>Sortie :</b>	Afficher $N$

2. [1 point] A l'aide de la calculatrice, établir en quelle année l'opérateur fera des bénéfices pour la première fois ?

On constate que :

En 2017	:	$u_4 \approx 24,963 < 25$	(millions d'abonnés)
En 2018	:	$u_5 \approx 25,966 > 25$	(millions d'abonnés)

C'est donc à partir de 2018 que l'opérateur fera des bénéfices.

**Exercice 3. D'après Bac ES 2014 : Polynésie****4.5 points****Partie A****2 points****1. [0.5 point] Quel est le coût total de production pour 450 objets ?**Le coût de production pour 450 objets est de **24 000 euros**.**2. [0.5 point] Combien d'objets sont produits pour un coût total de 60 000 euros ?**On produit environ **640 objets** pour un coût total de 60 000 euros.On considère que le coût marginal est donné par la fonction  $C'$  dérivée de la fonction  $C$ .**3. [1 point] Estimer le coût marginal pour une production de 450 objets puis de 600 objets.**

- Le coût marginal pour une production de 450 objets, soit 4,5 centaines d'objets, est donné par le nombre dérivé  $C'(4,5)$ . Il correspond donc au coefficient de la tangente à la courbe au point d'abscisse 4,5.

Par lecture graphique,  $C'(4,5) = 0$  car la tangente est horizontale en ce point.**Le coût marginal pour une production de 450 objets est donc de 0 centaine d'euro soit 0 euro.**

- De même pour 600 objets, le coût marginal est donné par le nombre dérivé  $C'(6)$ . Il correspond donc au coefficient de la tangente à la courbe au point d'abscisse 6.

Par lecture graphique :

$$C'(6) = \frac{600 - 100}{7 - 5} = 250$$

**Le coût marginal pour une production de 600 objets est donc de 250 centaines d'euros soit 25 000 euro****Partie B**


Le prix de vente de chacun de ces objets est de 75 euros.

**1. On note  $r$  la fonction « recette ». Pour tout nombre réel  $x$  dans l'intervalle  $[0; 7]$ ,  $r(x)$  est le prix de vente, en centaines d'euros, de  $x$  centaines d'objets. Représenter la fonction  $r$  dans le repère donné en annexe.**La fonction recette est la fonction linéaire, définie sur l'intervalle  $[0; 7]$  définie par :

$$r : \begin{cases} [0; 7] & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto r(x) = 75x \end{cases}$$

**2. En utilisant les représentations graphiques portées sur l'annexe, répondre aux questions qui suivent.****2. a. En supposant que tous les objets produits sont vendus, quelle est, pour l'entreprise, la fourchette maximale de rentabilité ? Justifier la réponse.**On cherche les valeurs de  $x$  pour lesquelles la droite se trouve au-dessus de la courbe avec un écart maximal. Le bénéfice est positif et l'entreprise rentable **entre 280 et 620 objets**. Le bénéfice est maximal pour une production d'environ 550 objet. Cela correspond à la valeur de  $x = 5,5$  pour laquelle l'écart entre les deux courbes est le plus grand dans cet intervalle de rentabilité.**2. b. Que penser de l'affirmation : « il est préférable pour l'entreprise de fabriquer 500 objets plutôt que 600 objets » ?**

L'écart entre la droite et la courbe est plus important pour 500 objets que pour 600 objets. Il est donc préférable de fabriquer 500 objets plutôt que 600 objets.



**Exercice 4. D'après Bac Polynésie, Juin 2014****3.5 points**

Les antibiotiques sont des molécules possédant la propriété de tuer des bactéries ou d'en limiter la propagation.

Le tableau ci-dessous donne la concentration dans le sang en fonction du temps d'un antibiotique injecté en une seule prise à un patient.

Temps en heure	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concentration en mg/l	1,6	2	1,9	1,6	1,2	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4

Ces données conduisent à la modélisation de la concentration en fonction du temps par la fonction  $g$  définie sur l'intervalle  $[0; 10]$  par

$$g(t) = \frac{4t}{t^2 + 1}.$$

Lorsque  $t$  représente le temps écoulé, en heures, depuis l'injection de l'antibiotique,  $g(t)$  représente la concentration en mg/l de l'antibiotique.

Le graphique suivant représente les données du tableau et la courbe représentative de la fonction  $g$ .

**1. Par lecture graphique donner sans justification :****1. a. les variations de la fonction  $g$  sur  $[0; 10]$  ;**


La fonction semble être croissante sur  $[0; 1]$  et décroissante sur  $[1; 10]$ .

**1. b. la concentration maximale d'antibiotique lors des 10 premières heures ;**

La concentration maximale est de **2 mg/l**.

**1. c. l'intervalle de temps pendant lequel la concentration de l'antibiotique dans le sang est supérieure à 1,2 mg/l.**

La concentration semble être supérieure à 1,2 mg/l sur  **$[0,4; 3]$**

**2.****2. a. La fonction  $g$  est dérivable sur l'intervalle  $[0; 10]$  et sa dérivée est  $g'$ . Montrer que :  $g'(t) = \frac{4(1-t^2)}{(t^2+1)^2}$ .**

La fonction  $g$  est dérivable sur  $[0; 10]$  et de la forme  $\frac{u}{v}$  :

$$g(t) = \frac{u(t)}{v(t)} \text{ avec } \begin{cases} u(t) = 4t & ; & u'(t) = 4 \\ v(t) = t^2 + 1 & ; & v'(t) = 2t \end{cases}$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \forall x \in [0; 10], \quad g'(t) &= \frac{u'(t)v(t) - u(t)v'(t)}{v(t)^2} \\ g'(t) &= \frac{4(t^2 + 1) - 4t \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} \\ g'(t) &= \frac{4(t^2 + 1 - 2t^2)}{(t^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

$$\boxed{\forall t \in [0; 10], \quad g'(t) = \frac{4(1-t^2)}{(t^2+1)^2}}$$

**2. b. [1 point] Les abscisses des points de  $\mathcal{C}_g$  ayant une tangente horizontale sont les solutions sur l'intervalle  $[0; 10]$  de l'équation  $g'(t) = 0$ .**

$$g'(t) = 0 \iff \frac{4(1-t^2)}{(t^2+1)^2} = 0 \iff 4(1-t^2) = 0 \iff 1-t^2 = 0 \iff t^2 = 1$$

Cette équation admet trivialement deux solutions réelles qui sont 1 et  $-1$ . Or seule la solution  $t = 1$  appartient à l'intervalle  $[0; 10]$ , de ce fait, le point  $A(1; 2)$  est la seule point de  $\mathcal{C}_g$  ayant une tangente horizontale.