



Fonction exponentielle

1re Maths Spécialité

ROC

Les **ROC**, (**R**estitution **O**rganisée de **C**onnaissances), sont les démonstrations du cours à connaître indiquées explicitement dans le nouveau programme de terminale. Ce chapitre compte 2 ROC.

I. La fonction exponentielle : une définition

I.1 Une approche historique

La naissance de la fonction exponentielle se produit à la fin du XVIIe siècle avec l'objectif de compléter la fonction puissance. Cependant, l'idée de combler les trous entre plusieurs puissances d'un même nombre est bien plus ancienne. Il faut attendre 1694 et le mathématicien français Jean Bernoulli (1667-1748) pour une introduction des fonctions exponentielles, cela dans une correspondance avec le mathématicien allemand Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Le mot « exponentielle » quant à lui apparaît pour la première fois dans la réponse de Leibniz. C'est le génial mathématicien suisse Leonhard Euler (1707-1783) utilisa pour la première fois la notation e .



Leonhard Euler (1707-1783)

I.2 Une approche ... mathématique

La façon d'introduire la fonction exponentielle au lycée a varié au cours des années. Sachez qu'il existe de nombreuses présentations possibles. Par exemple :


1. Comme Euler avec des suites géométriques.
2. En décrivant introduisant une fonction égale à sa dérivée comme dans ce cours (et dans le programme en vigueur).
3. A partir de la relation fonctionnelle que nous verrons : $f(x + y) = f(x)f(y)$ (voir exercice du TD).


I.3 Une introduction

De nombreux phénomènes physiques, biologiques, économiques ou autres sont modélisés par une fonction qui est proportionnelle à sa dérivée. Par exemple, le phénomène de désintégration de noyaux radioactifs.

Nous allons ici nous intéresser à l'une des fonctions de ce type. Plus particulièrement, que peut-on dire d'une fonction qui serait égale à sa dérivée ?


Nous connaissons déjà au moins une fonction égale à sa dérivée : la fonction nulle, notre objectif est d'en rechercher d'autres et de les étudier.



**Définition 1** (Fonction exponentielle)

On appelle fonction exponentielle, et on note \exp , l'unique fonction définie et dérivable sur \mathbb{R} , qui vérifie :

$$\begin{cases} \exp' = \exp \\ \exp(0) = 1 \end{cases}$$



Corollaire 1

Pour tout réel x , on a :

- | | |
|--|--|
| <p>1. $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$.</p> <p>2. $\exp(nx) = (\exp(x))^n$.</p> | <p>3. $\exp(x) > 0$.</p> <p>4. $\exp\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\exp(x)}$.</p> |
|--|--|

**Preuve**

1. Calculer $\exp(x + (-y))$ et conclure.

2. Démonstration en deux étapes.

2. a. [Niveau Terminale] Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 0$, $\exp(nx) = (\exp(x))^n$.
 Notons pour tout entier naturel $n \geq 0$ la propriété

$$P(n) : \exp(nx) = (\exp(x))^n$$

- **Initialisation**

Pour $n = 0$, la propriété $P(n)$ est vraie puisque : $\exp(0 \cdot x) = \exp(0) = 1$ et $(\exp(x))^0 = 1$.

- **Hérédité**

Supposons que pour n entier fixé, $P(n)$ soit vérifiée et montrons qu'alors elle est aussi vraie au rang $n + 1$.

**Remarque**

On admet que :

- $\exp(nx) = (\exp(x))^n$
- $\exp(x + y) = \exp(x) \times \exp(y)$
(relation fonctionnelle)

Et on cherche à montrer que :

$\exp((n + 1)x) = (\exp(x))^{n+1}$	à prouver
------------------------------------	-----------

$$\begin{aligned}
 \exp((n + 1)x) &= \exp(nx + x) \\
 &= \exp(nx) \cdot \exp(x) \quad (\text{relation fonctionnelle}) \\
 &= (\exp(x))^n \cdot \exp(x) \quad (\text{Hypothèse de récurrence HR}) \\
 &= (\exp(x))^{n+1}
 \end{aligned}$$

On a alors montré que $\exp((n+1)x) = (\exp(x))^{n+1}$ et donc que $P(n+1)$ est vraie. La propriété est donc héréditaire.

- **Conclusion**

On a montré que $P(0)$ est vraie. De plus, la propriété est héréditaire. De ce fait la relation est vraie pour tout entier $n \geq 0$.

$\exp(nx) = (\exp(x))^n$

2. b. Pour n entier négatif, on pose $p = -n$. Montrer que $\exp(nx) = (\exp(x))^n$.
3. Exprimer $\exp(x)$ en fonction de $\exp\left(\frac{x}{2}\right)$ et conclure.
4. Exprimer $\exp(x)$ en fonction de $\exp\left(\frac{x}{2}\right)$, utiliser le résultat précédent et conclure.

