

# Terminale S

---

BACCALAURÉAT BLANC

24/03/2016

---

## Épreuve de Mathématiques

---

**Durée 4 heures**

Le sujet comporte **5** pages en plus de la page de garde, dont une annexe graphique à rendre avec la copie.

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

En particulier, **tous les résultats doivent être justifiés**, brièvement, mais clairement.

Les candidats sont invités à **encadrer** dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.

Si un candidat ne sait pas répondre à une question, il pourra en admettre le résultat après l'avoir clairement indiqué sur sa copie, et l'utiliser dans les questions suivantes,

<p>Toute prise d'initiative, toute démarche ou recherche, incomplète ou infructueuse, pourra être prise en compte dans l'appréciation de la copie.</p>
--

# Épreuve de Mathématiques

---

**Durée 4 heures**

## Exercice 1

**5 points**

Les 300 personnes travaillant dans un immeuble de bureaux de trois niveaux ont répondu aux deux questions suivantes :

- « À quel niveau est votre bureau ? »
- « Empruntez-vous l'ascenseur ou l'escalier pour vous y rendre ? »

Voici les réponses :

- 225 personnes utilisent l'ascenseur et, parmi celles-ci, 50 vont au 1<sup>er</sup> niveau, 75 vont au 2<sup>ème</sup> niveau et 100 vont au 3<sup>ème</sup> niveau.
- Les autres personnes utilisent l'escalier et, parmi celles-ci, un tiers va au 2e niveau, les autres vont au 1<sup>er</sup> niveau.

On choisit au hasard une personne de cette population. On pourra considérer les événements suivants :

- $N_1$  : « La personne va au premier niveau. »
- $N_2$  : « La personne va au deuxième niveau. »
- $N_3$  : « La personne va au troisième niveau. »
- $E$  : « La personne emprunte l'escalier. »

1. Traduire l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré.
2. a. Montrer que la probabilité que la personne aille au 2<sup>ème</sup> niveau par l'escalier est égale à  $\frac{1}{12}$ .  
b. Montrer que les événements  $N_1$ ,  $N_2$  et  $N_3$  sont équiprobables.  
c. Déterminer la probabilité que la personne emprunte l'escalier sachant qu'elle va au 2<sup>ème</sup> niveau.
3. On interroge désormais 20 personnes de cette population. On suppose que leurs réponses sont indépendantes les unes des autres.  
On appelle  $X$  la variable aléatoire qui, aux 20 personnes interrogées, associe le nombre de personnes allant au 2<sup>ème</sup> niveau.
  - a. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire  $X$ .
  - b. Déterminer, à  $10^{-4}$  près, la probabilité que 5 personnes exactement aillent au 2e niveau.
  - c. En moyenne sur les 20 personnes, combien vont au 2e niveau ?
4. Soit  $n$  un entier inférieur ou égal à 300. On interroge désormais  $n$  personnes de cette population. On suppose que leurs réponses sont indépendantes les unes des autres.  
Déterminer le plus petit entier  $n$  strictement positif tel que la probabilité de l'évènement « au moins une personne va au 2<sup>ème</sup> niveau » soit supérieure ou égale à 0,99.

**Exercice 2****7 points**

1. Pour tout entier naturel  $n$  non nul, on considère la fonction  $f_n$  définie sur  $]0;+\infty[$  par :

$$f_n(x) = \ln x + \frac{x}{n} - 1.$$

- Déterminer les limites de  $f_n$  en 0 et en  $+\infty$  puis étudier le sens de variations de  $f_n$ .
- Montrer que l'équation  $f_n(x) = 0$  admet une unique solution dans  $]0;+\infty[$ .

On note  $\alpha_n$  cette solution. Montrer qu'elle appartient à l'intervalle  $[1;e]$ .

- Déterminer le signe de  $f_n(x)$  suivant les valeurs du réel  $x$ .

2. Le plan est rapporté à un repère orthonormal  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . On note  $(\Gamma)$  la courbe représentative de la fonction logarithme népérien.  $(\Gamma)$  est fournie en annexe du sujet.

Soit  $n$  un entier naturel non nul.

- Déterminer une équation de la droite  $\Delta_n$  passant par le point A de coordonnées  $(0;1)$  et le point  $B_n$  de coordonnées  $(n;0)$ .
- Montrer que  $\alpha_n$  est l'abscisse du point d'intersection de  $(\Gamma)$  avec  $\Delta_n$ .
- Représenter sur le document fourni en annexe les droites  $\Delta_1, \Delta_2$  et  $\Delta_3$ , ainsi que les réels  $\alpha_1, \alpha_2$  et  $\alpha_3$ .
- Précisez la valeur de  $\alpha_1$  puis conjecturer le sens de variations de la suite  $(\alpha_n)$ .

3. a. Montrer que :

$$\forall x \in ]0;+\infty[, f_{n+1}(x) - f_n(x) = \frac{-x}{n(n+1)}.$$

- En déduire que  $f_n(\alpha_{n+1}) > 0$ .
- Déduire de la question précédente le sens de variations de la suite  $(\alpha_n)$ .
- Montrer que la suite  $(\alpha_n)$  converge.

4. Dans cette question,  $n$  est égal à 2, et on s'intéresse au terme  $\alpha_2$ .

- Montrer que  $1 < \alpha_2 < 2$ .
- On considère l'algorithme suivant :

```

Variables a, b, m
Début
    Affecter à a la valeur 1
    Affecter à b la valeur 2
    Tant que b-a>0,2 faire
        Affecter à m la valeur  $\frac{a+b}{2}$ 
        si  $\ln(m) + \frac{m}{2} - 1 > 0$  alors affecter à b la valeur m
            Sinon affecter à a la valeur m
        Fin de si
    Fin de Tant que
    Afficher  $\frac{a+b}{2}$ 
Fin

```

i. Faire tourner cet algorithme en complétant le tableau ci-dessous que l'on recopiera sur la copie.

	Étape 0	Étape 1	Étape 2	Étape 3	Affichage
<i>a</i>	1				
<i>b</i>	2				
<i>b - a</i>					
<i>m</i>					

ii. Que représente la valeur affichée par cet algorithme ?

**Exercice 3**

**3 points**

Pour chaque réel *a*, on considère la fonction *f<sub>a</sub>* définie sur l'ensemble **R** des nombres réels par

$$f_a(x) = e^{x-a} - 2x + e^a .$$

1. Démontrer que pour tout réel *a*, la fonction *f<sub>a</sub>* possède un minimum.
2. Existe-t-il une valeur de *a* pour laquelle ce minimum est le plus petit possible ?

## Exercice 4

5 points

Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité.

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .

On note  $i$  le nombre complexe tel que  $i^2 = -1$ .

On considère le point  $A$  d'affixe  $z_A = 1$  et le point  $B$  d'affixe  $z_B = i$ .

À tout point  $M$  d'affixe  $z_M = x + iy$ , avec  $x$  et  $y$  deux réels tels que  $y \neq 0$ , on associe le point  $M'$  d'affixe  $z_{M'} = -iz_M$ .

On désigne par  $I$  le milieu du segment  $[AM]$ .

1. Dans cette question et uniquement dans cette question, on prend  $z_M = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$ .

a. Déterminer la forme algébrique de  $z_M$ .

b. Montrer que  $z_{M'} = -\sqrt{3} - i$ .

Déterminer le module et un argument de  $z_{M'}$ .

c. Placer les points  $A$ ,  $B$ ,  $M$ ,  $M'$  et  $I$  dans le repère  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  en prenant 2 cm pour unité graphique.

Tracer la droite  $(OI)$ . À partir du graphique, que peut-on conjecturer :

i. Sur les droites  $(BM')$  et  $(OI)$  ?

ii. Sur la valeur du quotient  $\frac{BM'}{OI}$  ?

2. On revient au cas général en prenant  $z_M = x + iy$  avec  $y \neq 0$ .

a. Déterminer l'affixe du point  $I$  en fonction de  $x$  et  $y$ .

b. Déterminer l'affixe du point  $M'$  en fonction de  $x$  et  $y$ .

c. Écrire les coordonnées des points  $I$ ,  $B$  et  $M'$ .

d. Démontrer les conjectures émises à la question 1.c.

## Annexe de l'exercice 2

