



Math93.com

TD 1 - Seconde

Trigonométrie

Table des matières


I	Enroulement de la droite des réels	2
II	Cosinus et sinus d'un réel	4
III	Calculer en utilisant les angles remarquables	8
IV	A partir du cosinus ou sinus d'un angle particulier	9
V	Déterminer un angle connaissant sinus ou cosinus	10
VI	Équations trigonométriques	11
VII	Bilan et compléments	12
VIII	Annexe	15
IX	Correction	16

Partie I. Enroulement de la droite des réels

Exercice 1. Des points sur le cercle trigonométrique


Placer sur le cercle trigonométrique les points A, B, C, D, E et F repérés respectivement par les réels

$$\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{2}, -\frac{3\pi}{4}, -\frac{5\pi}{4}.$$



Exercice 2. Dans un pentagone

Le pentagone $ABCDE$ est inscrit dans le cercle trigonométrique \mathcal{C} .



1. Quelle est la longueur de l'arc \widehat{AB} ?
2. À quels réels de l'intervalle $] -\pi ; \pi]$ sont associés les sommets de ce pentagone ?

Point	A	B	C	D	E
Réel associé dans $] -\pi ; \pi]$	$\frac{\pi}{2}$

**Réponses**

$$(1.) \widehat{AB} = \frac{2\pi}{5} \quad (2.) B\left(\frac{9\pi}{10}\right); C\left(-\frac{7\pi}{10}\right); D\left(-\frac{3\pi}{10}\right); E\left(\frac{\pi}{10}\right).$$

Exercice 3. Notion de mesure principale**Rappels**

- Par enroulement de la droite numérique sur le cercle trigonométrique, on peut associer à tout réel un unique point du cercle.
- Soit x un réel et M un point du cercle trigonométrique associé au réel x , alors le point M est associé à tous les réels de la forme $x + k \times 2\pi$, où k est un entier relatif, $k \in \mathbb{Z}$.
- Mesure principale.**
Parmi tous les réels de la forme $x + k \times 2\pi$, (où k est un entier relatif) qui sont associés(au point M , on va privilégier celui qui appartient à l'intervalle $] -\pi ; \pi]$.
Dans le repère orthonormé $(O; I; J)$, cela correspond en fait au plus petit arc reliant I et M .

1. Soit A le point image du nombre réel $\frac{27\pi}{4}$ sur le cercle trigonométrique.

1. a. Effectuer la division euclidienne de 27 par 4.

$$\begin{array}{r} 27 \\ 4 \overline{) 27} \\ \underline{20} \\ 7 \\ 6 \\ \underline{6} \\ 1 \end{array} \quad \implies \quad 27 = 4 \times \dots + \dots$$

1. b. Montrer alors que $\frac{27\pi}{4}$ peut s'écrire sous la forme :

$$\frac{27\pi}{4} = \alpha + k \times 2\pi \quad , \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \alpha \in] -\pi ; \pi] \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

1. c. Le réel α est alors la mesure principale de $\frac{27\pi}{4}$. Placer le point A sur le cercle trigonométrique.

2. Soit B le point image sur le cercle trigonométrique du nombre réel $-\frac{17\pi}{3}$.


Déterminer la mesure principale du réel $-\frac{17\pi}{3}$, c'est à dire déterminer le réel α de l'intervalle $] -\pi ; \pi]$ qui a le même point image B sur le cercle. Placer B sur le cercle.

3. Soit C le point image sur le cercle trigonométrique du nombre réel $\frac{163\pi}{4}$.

Déterminer la mesure principale du réel $\frac{163\pi}{4}$, c'est à dire déterminer le réel α de l'intervalle $] -\pi ; \pi]$ qui a le même point image C sur le cercle. Placer C sur le cercle.

4. Soit D le point image sur le cercle trigonométrique du nombre réel $\frac{1045\pi}{3}$.

Déterminer la mesure principale du réel $\frac{1045\pi}{3}$ et placer D sur le cercle.






Réponses

1°) et 2°) $A\left(\frac{3\pi}{4}\right)$; $B\left(-\frac{5\pi}{3}\right)$; corrigé en vidéo; 3°) $C\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ corrigé en vidéo

Partie II. Cosinus et sinus d'un réel



Angle en degré	0°	30°	45°	60°	90°	180°
Angle en radian x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	Non défini	0


Exercice 4. Dans les quadrants

On considère le cercle trigonométrique ci-contre.

M est le point image sur le cercle d'un nombre réel x .

Recopier et compléter le tableau suivant avec le signe de $\cos(x)$ et $\sin(x)$ en fonction de la position du point M sur le cercle.

M est dans le quadrant ...	1	2	3	4
Signe de $\cos(x)$				
Signe de $\sin(x)$				



Exercice 5. Sinus et cosinus d'angles remarquables : à partir de $\frac{\pi}{4}$

1. On sait qu'un angle $\frac{\pi}{4}$ radian correspond à un angle de 45 degré. Cela nous permet de placer facilement le point M du cercle trigonométrique associé à $\frac{\pi}{4}$. Il suffit de prendre le point du cercle qui est sur la première bissectrice du repère (O; I; J). On a construit ce point M.


2. Placer les points A, B et C du cercle trigonométrique associés aux réels :

$$\frac{3\pi}{4}; -\frac{\pi}{4}; -\frac{3\pi}{4}.$$

3. Donner les valeurs exactes des sinus et cosinus des réels précédents.

$$\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \\ \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \end{cases} \quad \begin{cases} \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \\ \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \\ \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \end{cases} \quad \begin{cases} \cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = \\ \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = \end{cases}$$



Exercice 6. Sinus et cosinus d'angles remarquables : à partir de $\frac{\pi}{3}$

1. On sait que le cosinus de $\frac{\pi}{3}$ vaut $\frac{1}{2}$ et cela nous permet de placer facilement le point M du cercle trigonométrique associé à $\frac{\pi}{3}$. Il suffit de prendre le point du cercle d'abscisse 0,5. On a placé ce point M.


2. En utilisant la méthode de construction de l'hexagone régulier et des symétrie évidentes, placer les points A, B et C du cercle trigonométrique associés aux réels :

$$\frac{2\pi}{3}; -\frac{\pi}{3}; -\frac{2\pi}{3}.$$

3. Donner les valeurs exactes des sinus et cosinus des réels précédents.

$$\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \\ \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \end{cases} \quad \begin{cases} \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \\ \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \\ \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \end{cases} \quad \begin{cases} \cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \\ \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \end{cases}$$



Exercice 7. Sinus et cosinus d'angles remarquables : à partir de $\frac{\pi}{6}$

1. On sait que le sinus de $\frac{\pi}{6}$ vaut $\frac{1}{2}$ et cela nous permet de placer facilement le point M du cercle trigonométrique associé à $\frac{\pi}{6}$. Il suffit de prendre le point du cercle d'ordonnée 0,5. On a placé ce point M.


2. En utilisant des symétries évidentes, placer les points A, B et C du cercle trigonométrique associés aux réels :

$$\frac{5\pi}{6}; -\frac{\pi}{6}; -\frac{5\pi}{6}.$$

3. Donner les valeurs exactes des sinus et cosinus des réels précédents.


$$\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \\ \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \end{cases} \quad \begin{cases} \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \\ \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \\ \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \end{cases} \quad \begin{cases} \cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = \\ \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = \end{cases}$$



Exercice 8. Des points sur le cercle trigonométrique, et leurs coordonnées

1. Placer sur le cercle trigonométrique les points A , B , C et D repérés respectivement par les réels $-\frac{2\pi}{3}$, $-\frac{3\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{3}$.



2. Donner les coordonnées des quatre points A , B , C et D .

Réponses

(2.) $A\left(-\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right); B\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right); C\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right); D\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$

Partie III. Calculer en utilisant les angles remarquables

Exercice 9. Utiliser les angles remarquables

Sans utiliser de calculatrice, calculer :

$$A = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \times \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) + \sin(\pi)$$

Exercice 10. Calculer et réduire au même dénominateur 1


Sans calculatrice, calculer et réduire au même dénominateur les expressions suivantes. On pourra s'aider du cercle trigonométrique et on indiquera les étapes intermédiaires.

$$1. A = \cos\left(\frac{-\pi}{3}\right) - \sin\left(\frac{-7\pi}{4}\right)$$

$$2. B = \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) - \sin(2\pi) + \cos\left(\frac{-\pi}{6}\right)$$

$$3. C = \cos(-2018\pi) - \cos\left(\frac{-\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$4. D = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$$



Exercice 11. Calculer les expressions trigonométriques

Sans calculatrice, calculer les expressions suivantes.


On pourra s'aider du cercle trigonométrique et on indiquera les étapes intermédiaires s'il y en a.

$$1. A = \cos^2\left(\frac{-\pi}{13}\right) + \sin^2\left(\frac{-\pi}{13}\right)$$

$$2. B = \cos^2\left(\frac{-\pi}{6}\right) - \sin^2\left(\frac{-\pi}{6}\right)$$

$$3. C = \sin\left(\frac{-5\pi}{6}\right) \times \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) - \cos(-\pi)$$

$$4. D = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\cos^2\left(\frac{\pi}{3}\right)}$$



Partie IV. A partir du cosinus ou sinus d'un angle particulier

Exercice 12. A partir d'un cosinus de $\left(\frac{\pi}{12}\right)$

Sachant que $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$, déterminer :

- | | | |
|---|--|---|
| <p>a. $\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right)$</p> <p>b. $\cos\left(\pi - \frac{\pi}{12}\right)$</p> <p>c. $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{12}\right)$</p> | | <p>d. $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$</p> <p>e. $\sin\left(\frac{13\pi}{12}\right)$</p> |
|---|--|---|

Exercice 13. A partir d'un sinus de $\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ (c)

Sachant que $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$.

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1. Calculer la valeur exacte de $\cos^2\left(\frac{7\pi}{12}\right)$</p> | | <p>2. En déduire la valeur exacte de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.</p> |
|--|--|---|

Partie V. Déterminer un angle connaissant sinus ou cosinus

Exercice 14. Arcsin et Arccos

1. En utilisant les touches $\boxed{\cos^{-1}}$ ou $\boxed{\arccos}$ et $\boxed{\sin^{-1}}$ ou $\boxed{\arcsin}$ de la calculatrice, déterminer une valeur de x arrondie à 0,1 degré près, en degré puis en radian dans les cas suivants.

$$\cos(x) = 0,5$$

$$\left| \sin(x) = 0,2 \right.$$

$$\left| \sin(x) = -0,5 \right.$$

2. La calculatrice affiche-t-elle toutes les possibilités? Justifier.

Exercice 15. Déterminer un angle connaissant le sinus ou le cosinus

Donner, dans chaque cas, deux réels x dans l'intervalle $] -\pi ; \pi]$ vérifiant la condition donnée.

1. Sans utiliser la calculatrice, déterminer une valeur de x dans les cas suivants.

$$\cos(x) = \frac{1}{2}$$

$$\left| \sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \right.$$

$$\left| \sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \right.$$

2. Donner toutes les valeurs possibles.

Partie VI. Équations trigonométriques

Exercice 16. Équations trigonométriques

Dans chaque cas, déterminer les réels x tels que :

$$1. \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } x \in]-\pi; \pi] \quad \Bigg| \quad 2. \sin x = \frac{1}{2} \text{ et } x \in [0; \pi]$$

Exercice 17. Équations trigonométriques

Résoudre dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$ l'équation $4 \cos^2 x - 3 = 0$.

Exercice 18. Équations trigonométriques

Soit x un réel de l'intervalle $[\frac{\pi}{2}; \pi]$ tel que $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Calculer $\cos x$.

Exercice 19. Équations

1. Soit pour X réel l'expression du second degré

$$A(X) = X^2 - X - \frac{3}{4}$$

1. a. Par la méthode de votre choix, montrer que la forme canonique de $A(X)$ est :

$$A(x) = \left(X - \frac{1}{2}\right)^2 - 1$$

1. b. Résoudre alors dans \mathbb{R} l'équation $A(X) = 0$.

2. En déduire les solutions dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$ de l'équation :

$$\sin^2 x - \sin x - \frac{3}{4} = 0$$



Remarque

$$\sin^2 x = (\sin x)^2$$




Réponses

- Exercice 16 : (1.) $x = \frac{3\pi}{4}$ ou $x = -\frac{3\pi}{4}$ (2.) $x = \frac{5\pi}{6}$ ou $x = \frac{\pi}{6}$
- Exercice 17 : $x = \frac{5\pi}{6}$ ou $x = \frac{\pi}{6}$
- Exercice 18 : $\cos x = -\frac{\sqrt{6}}{3}$
- Exercice 19 : (1.) $X = -\frac{1}{2}$ ou $X = \frac{3}{2}$ (2.) $S = \left\{-\frac{\pi}{6}; -\frac{5\pi}{6}\right\}$.

Partie VII. Bilan et compléments

Exercice 20. Octogone : Un polygone régulier ABCDEFGH

Sur le cercle trigonométrique associé au repère orthonormé $(O; I, J)$, on a tracé l'octogone $ABCDEFGH$, un polygone régulier à huit côtés.



Par enroulement de la droite réelle sur le cercle trigonométrique, le point A est associé au réel $\frac{\pi}{12}$.

Le polygone régulier $ABCDEFGH$ ayant des angles au centre égaux à $\frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$, le point B est associé au réel : $\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{3}$.

1. Compléter le tableau suivant :

Point	A	B	C	D	E	F	G	H
Réel associé dans $]-\pi; \pi]$	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{3}$

2. Donner les valeurs exactes des coordonnées du point B .

3. On donne $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.

3. a. Calculer la valeur exacte de $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

3. b. En déduire les valeurs exactes du cosinus et du sinus des réels $\frac{11\pi}{12}$ et $\frac{13\pi}{12}$.

Réponses

(1.) $\frac{7\pi}{12}; \frac{5\pi}{6}; -\frac{11\pi}{12}; -\frac{2\pi}{3}; -\frac{5\pi}{12}; -\frac{\pi}{6}$ (2.) $B\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ (3.a.) $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$
 (3.b.) $\sin\left(\frac{11\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$; $\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right) = \frac{-\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$; $\sin\left(\frac{13\pi}{12}\right) = \frac{-\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$; $\cos\left(\frac{13\pi}{12}\right) = \frac{-\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

Exercice 21. Avec la tangente

La tangente d'un réel x est définie par $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ pour toutes les valeurs de $x \in \mathcal{D}_T$ où $\cos(x) \neq 0$.

Montrer que pour tous les réels $x \in \mathcal{D}_T$, on a :

$$\tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} - 1$$

Exercice 22. Angle Addition formulas and more (c)

On admet les formules suivantes :



Formules d'addition (Si-CO-CO-SI CO-CO-SI-SI)

Pour tous les réels a et b on a :

- $\sin(a + b) = \sin a \times \cos b + \cos a \times \sin b$
- $\cos(a + b) = \cos a \times \cos b - \sin a \times \sin b$



Mémo

1. Si-CO-CO-SI CO-CO-SI-SI
2. priorité au Sinus et à l'addition
3. moins 1 à la dernière.

En utilisant, entre autres, les formules d'addition établir les formules :

1. $\sin(a - b) = \sin(a) \cos(b) - \sin(b) \cos(a)$.
2. $\cos(a - b) = \cos(a) \cos(b) + \sin(b) \sin(a)$.
3. $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$.
4. $\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$.

Formules de duplication du cosinus

5. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$.
6. $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$
7. $\cos 2a = 1 - 2 \sin^2 a$

Formules de duplication du sinus

8. $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$.
9. $\sin 2a = \frac{2 \tan a}{1 + \tan^2 a}$.

Formules de duplication de la tangente

10. $\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$.

Power reducing Formulas

11. $\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$.

12. $\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$.

13. $\tan^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{1 + \cos 2a}$

Sum-to-Product Formulas

14. $\sin a + \sin b = 2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$.

15. $\cos a + \cos b = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$.

Exercice 23. $\cos \frac{\pi}{8}$


1. A l'aide d'une des formules précédentes de l'exercice 22, calculer la valeur exacte de $\cos^2 \frac{\pi}{8}$.
2. En déduire la valeur exacte de $\cos \frac{\pi}{8}$ et de $\sin \frac{\pi}{8}$.

Exercice 24. A partir de $\tan x/2$

En posant $t = \tan \frac{a}{2}$, montrer que, sous réserve d'existence avec a réel :

$$\sin a = \frac{2t}{1+t^2} ; \cos a = \frac{1-t^2}{1+t^2} ; \tan a = \frac{2t}{1-t^2}$$

Partie VIII. Annexe



Partie IX. Correction

Correction de l'exercice 13

On donne $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$.

1. Calculer la valeur exacte de $\cos^2\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

On sait que : $\cos^2\left(\frac{7\pi}{12}\right) + \sin^2\left(\frac{7\pi}{12}\right) = 1$ donc f(6)

$$\cos^2\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}.$$

2. En déduire la valeur exacte de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

On a $\frac{\pi}{2} < \frac{7\pi}{12} < \frac{3\pi}{2}$ donc $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) < 0$ et donc f(6)

$$\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = -\sqrt{\cos^2\left(\frac{7\pi}{12}\right)} = -\sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}.$$