

# E.P.I.T.A.

## Epreuve de mathématiques (3 h)

L'objet de ce problème est d'obtenir quelques résultats à propos de l'équation fonctionnelle :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(g(x)).$$

La fonction  $g$ , qui est continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , est ici donnée et on cherche l'ensemble  $\mathcal{E}(g)$  des fonctions  $f$  continues de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  vérifiant la relation précédente.

Dans la partie I, on traite le cas où  $g(x) = g_{a,b}(x) = ax + b$  avec  $a, b$  réels. Dans la partie II, on démontre, sous certaines hypothèses, que  $\mathcal{E}(g)$  peut se réduire aux fonctions constantes. Enfin, dans la partie III, on traite les cas où  $g(x) = x^2$  et où  $g(x) = e^x$ .

### ■ Partie I : Les fonctions continues vérifiant $f(x) = f(ax + b)$

Pour tout couple  $(a, b)$  de  $\mathbb{R}^2$  distinct de  $(1, 0)$ , on pose ici :  $\forall x \in \mathbb{R}, g_{a,b}(x) = ax + b$ .

On se propose alors de déterminer l'ensemble  $\mathcal{E}(g_{a,b})$  des fonctions continues de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  vérifiant la relation  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(g_{a,b}(x))$ , c'est à dire  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(ax + b)$ .

1°) *Etude du cas particulier  $|a| = 1$*

a) On suppose que  $a = 1$  et  $b \neq 0$ .

- A quelle condition sur le réel  $\omega$  les fonctions  $c : x \rightarrow \cos(\omega x)$  et  $s : x \rightarrow \sin(\omega x)$  appartiennent-elles à l'ensemble  $\mathcal{E}(g_{1,b})$ ?
- Quelles sont les fonctions appartenant à l'ensemble  $\mathcal{E}(g_{1,b})$ ?

b) On suppose que  $a = -1$ .

- Préciser quelles sont les fonctions appartenant à l'ensemble  $\mathcal{E}(g_{-1,0})$ ?
- Etablir l'équivalence des deux relations suivantes pour  $f$  continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  :  
(1)  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(-x + b)$  ; (2)  $\forall x \in \mathbb{R}, f\left(\frac{b}{2} + x\right) = f\left(\frac{b}{2} - x\right)$ .
- En déduire les fonctions appartenant à l'ensemble  $\mathcal{E}(g_{-1,b})$ .

2°) *Etude du cas  $|a| < 1$*

On considère ici la suite de premier terme  $x_0 = x$ , où  $x$  est un réel quelconque donné, et définie ensuite par la relation de récurrence  $x_{n+1} = ax_n + b$  où le réel  $a$  vérifie  $|a| < 1$ .

- Montrer que si la suite  $(x_n)$  converge vers un nombre réel  $L$ , alors on a  $L = b/(1 - a)$ .
- Pour tout entier naturel  $n$ , exprimer  $x_{n+1} - L$  en fonction de  $x_n - L$ , puis en déduire :
  - l'expression de  $x_n$  en fonction de  $a^n$ ,  $x$  et  $L$ .
  - la convergence et la limite de la suite  $(x_n)$ .
- Vérifier, si  $f$  appartient à  $\mathcal{E}(g_{a,b})$ , qu'on a  $f(x_{n+1}) = f(x_n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .  
En déduire, si  $f \in \mathcal{E}(g_{a,b})$  avec  $|a| < 1$ , qu'on a :  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(L)$ .
- En déduire les fonctions appartenant à l'ensemble  $\mathcal{E}(g_{a,b})$  lorsque  $|a| < 1$ .

3°) *Etude du cas  $|a| > 1$*

a) Etablir (si  $a \neq 0$ ) l'équivalence des deux relations suivantes pour  $f$  continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  :

$$(1) \quad \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(ax + b) \quad ; \quad (2) \quad \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f\left(\frac{x}{a} - \frac{b}{a}\right).$$

b) En déduire les fonctions appartenant à l'ensemble  $\mathcal{E}(g_{a,b})$  lorsque  $|a| > 1$ .

## ■ Partie II : Deux cas où les solutions de $f(x) = f(g(x))$ sont constantes

4°) *Etude des points fixes de la fonction  $g$  lorsque  $|g'| \leq K < 1$*

On suppose ici que la fonction  $g$  est de classe  $C^1$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et vérifie l'hypothèse ( $\mathcal{H}$ ) : il existe un nombre réel positif  $K < 1$  tel que :  $\forall x \in \mathbb{R}, |g'(x)| \leq K$ .

a) Etablir, à l'aide de l'inégalité des accroissements finis, qu'on a pour tout réel  $x$  :

$$g(0) - K|x| \leq g(x) \leq g(0) + K|x|.$$

b) En déduire les limites de la fonction  $x \rightarrow g(x) - x$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$  et vers  $-\infty$ .

c) Etudier enfin le sens de variation de la fonction  $x \rightarrow g(x) - x$  et en déduire qu'il existe un unique point fixe de  $g$ , c'est à dire un unique nombre réel  $L$  tel que  $g(L) = L$ .

5°) *Etude de l'ensemble  $\mathcal{E}(g)$  lorsque  $|g'| \leq K < 1$*

On garde les hypothèses et les notations de la question précédente (on a donc  $g(L) = L$ ), et on considère la suite de premier terme  $x_0 = x$ , où  $x \in \mathbb{R}$ , et définie ensuite par  $x_{n+1} = g(x_n)$ .

a) Montrer, pour tout entier naturel  $n$ , l'inégalité  $|x_{n+1} - L| \leq K|x_n - L|$ .

En déduire que la suite  $(x_n)$  converge vers  $L$ .

b) Etablir, si  $f$  appartient à  $\mathcal{E}(g)$ , qu'on a  $f(x_{n+1}) = f(x_n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

En déduire, si  $f \in \mathcal{E}(g)$ , qu'on a :  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(L)$ .

c) En déduire les fonctions appartenant à l'ensemble  $\mathcal{E}(g)$ .

6°) *Recherche de fonctions vérifiant l'hypothèse ( $\mathcal{H}$ )*

Pour obtenir des fonctions  $g$  de classe  $C^1$  qui vérifient l'hypothèse ( $\mathcal{H}$ ), on recherche ici les fonctions  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$  dont la dérivée  $g'$  est la restriction à l'ensemble  $\mathbb{R}$  d'une fonction  $S$  développable en série entière sur  $\mathbb{C}$  (de rayon de convergence  $R = +\infty$ ), avec  $S(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$  pour  $z \in \mathbb{C}$ , et bornée sur  $\mathbb{C}$  par un réel  $K < 1$  ( $\forall z \in \mathbb{C}, |S(z)| \leq K$ ).

a) Pour tout entier naturel  $n$  et tout nombre réel positif  $r$ , montrer la convergence normale de la série de fonctions suivante lorsque sa variable réelle  $t$  décrit le segment  $[0, 2\pi]$  :

$$S(r e^{it}) e^{-in t} = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k r^k e^{(k-n)it}.$$

b) Pour tout couple  $(k, n) \in \mathbb{N}^2$ , calculer  $\int_0^{2\pi} e^{(k-n)it} dt$  en distinguant le cas où  $k = n$ .

c) Montrer alors, en citant précisément le théorème utilisé et en vérifiant ses hypothèses, qu'on a pour tout entier naturel  $n$  et tout nombre réel positif  $r$  :

$$\int_0^{2\pi} e^{-in t} S(r e^{it}) dt = 2\pi a_n r^n.$$

d) En déduire, si  $|S|$  est bornée par  $K < 1$ , qu'on a  $|a_n| \leq \frac{K}{r^n}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et tout  $r > 0$ ,

puis en faisant tendre  $r$  vers  $+\infty$ , montrer que  $S$  est constante, égale à  $a_0$  avec  $|a_0| < 1$ .

Montrer qu'on retrouve ainsi les fonctions  $g_{a,b}$  avec  $|a| < 1$  étudiées à la question I.2°.

7°) *Etude de l'ensemble  $\mathcal{E}(g)$  lorsque  $|g'| \geq K > 1$*

On suppose ici que la fonction  $g$  est de classe  $C^1$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et vérifie l'hypothèse ( $\mathcal{H}'$ ) : il existe un nombre réel  $K > 1$  tel que :  $\forall x \in \mathbb{R}, |g'(x)| \geq K$ .

a) Montrer que  $g'$  ne change pas de signe sur  $\mathbb{R}$ , et qu'on a nécessairement :

- soit  $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) \geq +K$ , et  $g$  est alors strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  de  $-\infty$  à  $+\infty$ .
- soit  $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) \leq -K$ , et  $g$  est alors strictement décroissante sur  $\mathbb{R}$  de  $+\infty$  à  $-\infty$ .

b) Montrer que  $g$  admet une fonction réciproque  $g^{-1}$ , définie et continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .

Exprimer  $(g^{-1})'(x)$ , et montrer que  $|(g^{-1})'(x)| \leq \frac{1}{K}$  pour  $x \in \mathbb{R}$ .

c) Montrer que  $f \in \mathcal{E}(g)$  si et seulement si  $f \in \mathcal{E}(g^{-1})$ , et en déduire  $\mathcal{E}(g)$  à l'aide de 5°.

### ■ Partie III : Les fonctions continues vérifiant $f(x) = f(x^2)$ et $f(x) = f(e^x)$

8°) *Recherche des fonctions continues telles que  $f(x) = f(x^2)$*

On suppose dans cette question que  $g(x) = x^2$ , de sorte que  $\mathcal{E}(g)$  désigne donc l'ensemble des fonctions continues de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  telles que :  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(x^2)$ .

On considère la suite de premier terme  $x_0 = x$ , où  $x$  est un réel strictement positif donné, et définie ensuite par la relation de récurrence  $x_{n+1} = \sqrt{x_n}$ .

a) Pour tout entier naturel  $n$ , vérifier que  $x_n = x^{1/2^n}$ .

En déduire la convergence de la suite  $(x_n)$ , et préciser alors sa limite.

b) Etablir, si  $f$  appartient à  $\mathcal{E}(g)$ , qu'on a  $f(x_{n+1}) = f(x_n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

c) En déduire les fonctions appartenant à l'ensemble  $\mathcal{E}(g)$  lorsque  $g(x) = x^2$ .

Montrer qu'on a ainsi le même résultat qu'aux questions 5 et 7 sans que les hypothèses ( $\mathcal{H}$ ) ou ( $\mathcal{H}'$ ) ne soient vérifiées : celles-ci sont donc suffisantes, mais pas nécessaires.

9°) *Recherche des fonctions continues telles que  $f(x) = f(e^x)$*

Dans cette dernière partie, on cherche des fonctions non constantes  $f$  appartenant à  $\mathcal{E}(\exp)$ , qui est l'ensemble des fonctions continues  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant :  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(e^x)$ .

a) Si  $f \in \mathcal{E}(\exp)$ , vérifier que  $f(0) = f(1)$ .

b) Si  $f \in \mathcal{E}(\exp)$  et si  $x < 0$ , vérifier que  $f(x) = f(e^x)$  où  $e^x \in ]0, 1]$ .

c) On considère la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par  $x_0 = 0$ , puis  $x_{n+1} = e^{x_n}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

- Etablir que  $x_{n+1} \geq x_n + 1$ , puis montrer que  $(x_n)$  croît strictement vers  $+\infty$ .
- Etablir que la fonction logarithme induit une bijection de  $]x_{n+1}, x_{n+2}]$  sur  $]x_n, x_{n+1}]$ .
- Si  $f \in \mathcal{E}(\exp)$ , en déduire que :  $\forall x \in ]x_{n+1}, x_{n+2}]$ ,  $f(x) = f(\ln(x))$  où  $\ln(x) \in ]x_n, x_{n+1}]$ .

d) Etant donnée une fonction continue  $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant la condition  $\varphi(0) = \varphi(1)$ , montrer qu'il existe une et une seule fonction  $f \in \mathcal{E}(\exp)$  qui coïncide avec  $\varphi$  sur  $[0, 1]$ .  
En déduire l'ensemble  $\mathcal{E}(\exp)$ .

---